



REC'D 24 OCT 2000

WIPO PCT

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 03 OCT. 2000

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

**DOCUMENT DE  
PRIORITÉ**  
PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA REGLE  
17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS Cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04  
Télécopie : 01 42 93 59 30



T



**REQUÊTE EN DÉLIVRANCE**

Confirmation d'un dépôt par télécopie ☐

Cet imprimé est à remplir à l'encre noire en lettres capitales

Réservé à l'INPI

DATE DE REMISE DES PIÈCES **7 SEPT 1999**  
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL **9911176**  
DÉPARTEMENT DE DÉPÔT **75 INPI PARIS**  
DATE DE DÉPÔT **7 sept 1999**

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE  
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

**ASSIEH BALINSKI**  
**RHODIA SERVICES**  
**Direction de la Propriété Industrielle**  
**25, quai Paul Doumer**  
**92408 COURBEVOIE CEDEX**

n° du pouvoir permanent 11/02/1998 références du correspondant R 99110/AB//VR téléphone 01 47 68 17 24

2 DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle

☒ brevet d'invention ☐ demande divisionnaire

☐ certificat d'utilité ☐ transformation d'une demande de brevet européen

☒ demande initiale

☐ brevet d'invention

☐ certificat d'utilité n° date

Établissement du rapport de recherche

☐ différé ☒ immédiat

Le demandeur, personne physique, requiert le paiement échelonné de la redevance

☐ oui ☒ non

Titre de l'invention (200 caractères maximum)

**Procédé de production d'exopolysaccharides.**

3 DEMANDEUR (S) n° SIREN **6 4 2 0 1 4 5 2 6** code APE-NAF

Nom et prénoms (souligner le nom patronymique) ou dénomination

**RHODIA CHIMIE**

Forme juridique

Nationalité (s) **Française**

Adresse (s) complète (s)

**25, quai Paul Doumer**  
**92408 COURBEVOIE CEDEX**

Pays

**FRANCE**

En cas d'insuffisance de place, poursuivre sur papier libre ☐

4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs ☐ oui ☐ non Si la réponse est non, fournir une désignation séparée

5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES ☐ requise pour la 1ère fois ☐ requise antérieurement au dépôt ; joindre copie de la décision d'admission

6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE

pays d'origine

numéro

date de dépôt

nature de la demande

7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n°

date

n°

date

8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE  
(nom et qualité du signataire - n° d'inscription)

**W. Balinski**  
**Assieh BALINSKI**

SIGNATURE DU PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION

SIGNATURE APRÈS ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE À L'INPI

DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR

(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

DEPARTEMENT DES BREVETS

26bis, rue de Saint-Petersbourg

75800 Paris Cédex 08

Tél. : 01 53 04 53 04 - Télécopie : 01 42 93 59 30

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

**99 11176**

**R 99110/AB**

TITRE DE L'INVENTION :

**Procédé de production d'exopolysaccharides.**

LE(S) SOUSSIGNÉ(S)

**RHODIA CHIMIE**  
**25, quai Paul Doumer**  
**92048 COURBEVOIE CEDEX**  
**France**

DÉSIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) (indiquer nom, prénoms, adresse et souligner le nom patronymique) :

**NORE** **Olivier**  
**VILLERMAT**  
**79370 BEAUSSAIS**  
**France**

**SIMON** **Jean-Luc**  
**4, route de Limoges**  
**79500 MELLE**  
**France**

NOTA : A titre exceptionnel, le nom de l'inventeur peut être suivi de celui de la société à laquelle il appartient (société d'appartenance) lorsque celle-ci est différente de la société déposante ou titulaire.

Date et signature (s) du (des) demandeur (s) ou du mandataire



**Assieh BALINSKI**

**Courbevoie, le 15 octobre 1999**

# DOCUMENT COMPORTANT DES MODIFICATIONS

PAGE(S) DE LA DESCRIPTION OU DES REVENDECATIONS OU PLANCHE(S) DE DESSIN			R.M.*	DATE DE LA CORRESPONDANCE	TAMPON DATEUR DU CORRECTEUR
Modifiée(s)	Supprimée(s)	Ajoutée(s)			
14 et 15				28.03.00	31 MARS 2000 - VD

Un changement apporté à la rédaction des revendications d'origine, sauf si celui-ci découle des dispositions de l'article R.612-36 du code de la Propriété Intellectuelle, est signalé par la mention «R.M.» (revendications modifiées).

## PROCEDE DE PRODUCTION D'EXOPOLYSACCHARIDES

La présente invention a pour objet un procédé pour la production d'exopolysaccharides par fermentation au moyen de microorganismes. Plus spécifiquement, l'invention concerne un procédé pour la production  
5 d'exopolysaccharides par fermentation de microorganismes dans un milieu nutritif comportant au moins une source de carbone assimilable par les microorganismes et au moins une source organique d'azote dérivant d'une légumineuse possédant une teneur élevée en protéines.

Dans le cadre de la présente invention, le terme exopolysaccharide désigne les  
10 polysaccharides produits par des microorganismes.

Les exopolysaccharides de poids moléculaire élevé sont utilisés de manière croissante dans de nombreuses applications industrielles pour leurs propriétés épaississantes, viscosifiantes, émulsifiantes, stabilisantes dans les milieux notamment aqueux. Ainsi, la gomme xanthane, en raison de ses propriétés rhéologiques  
15 exceptionnelles, est utilisée dans des domaines aussi variés que le bâtiment, la peinture, le papier, le textile, les cosmétiques, l'alimentaire, l'agriculture, le traitement des eaux, le forage, la récupération du pétrole et autres.

Ces exopolysaccharides ont des poids moléculaires élevés, le plus souvent supérieurs à  $1.10^6$  g/mol (mesurés par perméation de gel), et sont constitués d'unités  
20 de glucose, mannose, galactose, rhamnose, acide glucuronique, acide mannuronique, acide guluronique, avec éventuellement des dérivés acétate et pyruvate. Leur structure particulière et leurs propriétés sont décrites par exemple dans l'ouvrage Industrial Gums - Whistler - 2<sup>nd</sup> Edition - Chapters XXI-XXIII (1973).

Les exopolysaccharides sont produits avantageusement par culture aérobie de  
25 microorganismes dans un milieu nutritif aqueux.

La gomme xanthane est produite par des bactéries du genre *Xanthomonas*. Les exopolysaccharides du même type peuvent être produits par une grande variété de microorganismes incluant parmi les plus notoires, ceux du genre *Agrobacterium*,  
30 *Arthrobacter*, *Alcaligenes* (Succinoglycane), *Pseudomonas* (Levan), *Rhizobium*, *Sclerotium* (Scleroglucane).

Le milieu nutritif aqueux comprend normalement, outre des éléments de croissance variés, une source de carbone et une source d'azote. Dans les fermentations industrielles, le choix de la source de carbone et/ou de la source d'azote est basé à la fois sur sa disponibilités, sur son coût et sur son aptitude à permettre des  
35 productivités élevés.

Dans certaines industries comme par exemple l'industrie alimentaire ou cosmétique, des contraintes supplémentaires interviennent. Dans ces domaines, les sources de carbone et d'azote doivent, en outre, être choisies de manière à obtenir

des exopolysaccharides satisfaisant aux exigences organoléptiques, sensorielles, et visuelles recherchées dans ces domaines.

Parmi les sources de carbone et d'azote habituellement utilisées, il n'est pas facile de trouver des sources qui répondent à la fois à toutes les exigences précitées.

5 Par exemple, dans les cas où le microorganisme n'est pas capable de consommer la totalité de la source de carbone nutritive, il reste des produits résiduels insolubles en fin de fermentation qui d'une part rendent le milieu propice au développement de souches contaminantes pouvant dégrader le moût avant séparation de l'exopolysaccharide, et d'autre part risquent de colorer l'exopolysaccharide lors des  
10 traitements thermiques de stérilisation et de clarification éventuels. Dans certains procédés de fermentation, pour remédier à cet inconvénient on propose d'utiliser des enzymes. D'autres mettent en œuvre des étapes de filtration et/ou de centrifugation. Quel que soit le procédé d'élimination de produits résiduels insolubles de fin de fermentation, il en résulte un coût de production accru.

15 Certaines sources de carbone et/ou d'azote présentent l'inconvénient d'allonger considérablement le cycle de fermentation entraînant notamment la contamination et donc la dégradation du moût avant séparation de l'exopolysaccharide, et la perte de production.

20 La nature de la source d'azote est particulièrement importante lorsque l'on cherche à obtenir un exopolysaccharide présentant de bonnes propriétés organoléptiques, sensorielles et visuelles. Elle est aussi responsable de la bonne productivité de l'exopolysaccharide.

Il a été constaté, et ce de manière tout à fait inattendu, que certaines sources dérivant d'une fraction de la graine de certaines légumineuses comme la caroube, était  
25 une source d'azote organique particulièrement intéressante dans la fermentation des microorganismes. Ces fractions se sont avérées satisfaire à l'ensemble des exigences précitées.

Parmi les fractions dérivant de la graine de caroube, celles possédant avantageusement une teneur élevée en protéines donnent des résultats  
30 particulièrement intéressants notamment en terme de productivité. Sur des milieux dit standards tels que ceux mentionnés dans exemple dans l'ouvrage Industrial Gums – Whistler – 2<sup>nd</sup> Edition – Chapters XXI-XXIII (1973), pour des fermentations témoins, les productivités sont de l'ordre de 0,3 à 0,4 g/(kg.h) ; pour les fractions dérivant de la graine de caroube cette productivité est supérieure à 0,4 g/(kg.h).

35 La présente invention a pour but de proposer un procédé de production d'exopolysaccharides par fermentation de microorganismes qui soit simple et économique.

Un autre but de l'invention est de proposer un procédé de production d'exopolysaccharides par fermentation de microorganismes qui évite les problèmes de contamination exposés ci-dessus.

5 Ainsi, l'invention a pour objet un procédé de production d'exopolysaccharides par fermentation de microorganismes caractérisé en ce que l'on conduit la fermentation dans un milieu nutritif comportant au moins une source de carbone assimilable par les microorganismes et au moins une source organique d'azote, ladite source dérivant d'une fraction de la graine de caroube.

10 D'autres avantages liés au choix notamment de la source d'azote sont la diminution de la durée des fermentations, la suppression de produits résiduels insolubles de fin de fermentation et une productivité améliorée.

De plus, ce procédé permet d'obtenir un exopolysaccharide ayant de bonnes propriétés organoléptiques, sensorielles et visuelles.

15 Par ailleurs, les propriétés rhéologiques de l'exopolysaccharide obtenu par ce procédé sont préservées et même dans certains cas améliorées.

Le procédé de l'invention est susceptible d'être appliqué à la production de tout exopolysaccharide par fermentation au moyen de microorganismes. De nombreux microorganismes tels que bactéries, levures, champignons, algues, sont capables de produire des exopolysaccharides. On peut citer entre autres :

- 20
  - des bactéries appartenant au genre *Xanthomonas* et plus particulièrement aux espèces décrites dans Bergey's Manual of Determinative Bacteriology (8<sup>e</sup> édition – 1974 – Williams N. Wilkins Co. Baltimore) telles que *Xanthomonas begoniae*, *Xanthomonas campestris*, *Xanthomonas carotae*, *Xanthomonas hederae*, *Xanthomonas incanae*, *Xanthomonas malvacearum*, *Xanthomonas papavericola*,
- 25
  - Xanthomonas phaseoli*, *Xanthomonas pisi*, *Xanthomonas vasculorum*, *Xanthomonas vesicatoria*, *Xanthomonas vitians*, *Xanthomonas pelargonii* ;
  - des bactéries appartenant au genre *Arthrobacter* et plus particulièrement les espèces *Arthrobacter stabilis*, *Arthrobacter viscosus* ;
  - des bactéries appartenant au genre *Erwinia* ;
- 30
  - des bactéries appartenant au genre *Azotobacter* et plus particulièrement l'espèce *Azotobacter indicus* ;
  - des bactéries au genre *Agrobacterium* et plus particulièrement les espèces *Agrobacterium radiobacter*, *Agrobacterium rhizogenes*, *Agrobacterium tumefaciens* ;
  - des bactéries appartenant au genre *Alcaligenes* et plus particulièrement
- 35
  - Alcaligenes faecalis* ;
  - des bactéries appartenant au genre *Pseudomonas* et plus particulièrement *Pseudomonas methanica* ;
  - des bactéries appartenant au genre *Corynebacterium* ;



- des bactéries appartenant au genre *Bacillus* et plus particulièrement *Bacillus polymyxa* ;
- des champignons appartenant au genre *Sclerotium* et plus particulièrement aux espèces *Sclerotium glucanicum*, *Sclerotium rolfsii* ou *Plectania occidentalis* ;
- 5   ▪ des champignons appartenant au genre *Aspergillus* et plus particulièrement aux espèces *Aspergillus itaconicus*, *Aspergillus terreus* ;
- des levures appartenant au genre *Hansenula* comme l'espèce *Hansenula capsulata*.

De préférence le microorganisme est une bactérie du genre *Xanthomonas* et plus  
10 particulièrement de l'espèce *Xanthomonas campestris*.

L'invention a pour objet principal un procédé de production d'exopolysaccharides par fermentation de microorganismes caractérisé en ce que l'on conduit la fermentation dans un milieu nutritif comportant au moins une source de carbone assimilable par les microorganismes et au moins une source organique d'azote, ladite source étant  
15 dérivée d'une fraction de la graine de caroube.

L'arbre de caroubier produit un fruit, constitué de deux parties, la cosse et la graine. La graine de caroube, et plus particulièrement la fraction endosperme de cette graine, est déjà largement valorisée sous la dénomination "gomme de caroube". Contigu à cette fraction endosperme, se trouve le germe qui est un sous produit  
20 obtenu en quantités importantes lors de l'isolement de la gomme de caroube.

Parmi les différentes fractions de la graine de caroube, il s'est avéré que toutes celles ayant une teneur élevée en protéines étaient plus particulièrement adaptées au procédé de la présente invention.

Ainsi, la fraction de la graine de caroube possède avantageusement une teneur  
25 en protéines d'au moins 45 %, de préférence d'au moins 50 %, et plus préférentiellement d'au moins 60 %, en poids par rapport au poids sec de la matière sèche.

La teneur en protéine est calculée à partir de la mesure de l'azote libéré par combustion à 950°C sous oxygène et mesuré par conductivité dans un flux d'hélium.  
30 L'appareillage utilisé est un LECO FP 428.

Ces protéines sont constitués aussi bien des acides aminés essentiels que des acides aminés non essentiels.

Un mode de réalisation particulier de l'invention consiste à mettre en œuvre des fractions de la graines de caroube dont les protéines ont avantageusement un taux  
35 élevé en arginine, en glutamine et/ou en acide glutamique, et en lysine.

Dans ce mode particulier, la teneur en arginine est avantageusement comprise entre 9 et 20 %, et de préférence entre 12 et 14 %, poids/poids par rapport à l'ensemble des acides aminés.

De la même façon, la teneur en glutamine et/ou acide glutamique est avantageusement comprise entre 18 et 30 %, de préférence entre 22 et 27 %, poids/poids par rapport à l'ensemble des acides aminés.

La teneur en lysine est avantageusement comprise entre 18 et 30 %, de préférence entre 12 et 14 %, poids/poids par rapport à l'ensemble des acides aminés.

La teneur en acides aminés est déterminée par des méthodes classiques et connues de l'homme du métier.

Outre les protéines, les fractions peuvent également comporter des lipides. Les exopolysaccharides produits par fermentation de microorganismes dans un milieu nutritif comportant au moins une source organique d'azote dérivée d'une fraction de la graine de caroube comportant des lipides, voient plus particulièrement leurs propriétés organoléptiques, visuelles et sensorielles sensiblement améliorées. Ces lipides empêchent également le moussage dans les phases de préculture.

Avantageusement, la teneur en lipides dans lesdites fractions est d'au moins 4 %, avantageusement d'au moins 5 %, et encore plus avantageusement varie entre 7 et 15 % en poids par rapport à la matière sèche.

La détermination de la teneur en lipides est ramenée à celle de la matière grasse totale. Elle est déterminée par extraction à l'hexane dans un extracteur Soxhlet. Le mode opératoire est le suivant :

- on pèse dans la cartouche de l'extracteur, environ exactement 10 g de farine de germe de caroube, soit E grammes, obturés avec un tampon de coton hydrophile ;
- on introduit dans un ballon de 250 ml, préalablement taré (P0 gramme), 150 ml d'hexane ;
- on extrait pendant environ 6 heures ;
- on évapore le solvant à l'aide d'un évaporateur rotatif et on termine le séchage du résidu dans une étuve à 105°C pendant 1 heure ;
- après refroidissement dans un dessiccateur, pèse le ballon contenant le résidu, soit P1 grammes.

La teneur en matière grasse et donc en lipides est déterminée selon la formule suivante :

$$\text{Teneur en matière grasse (\%)} = 100 \times (P1 - P0) / E$$

Parmi les composants caractéristiques présents dans ces lipides, on peut citer notamment les acides palmitique, stéarique, oléique et linoléique.

Outre les protéines et les lipides, les fractions de la graine de caroube peuvent aussi comporter des hydrates de carbone.

Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, ladite fraction est le germe de la graine de caroube.

Dans ce mode de réalisation, ladite fraction est préalablement débarrassée de ses fractions endospermes selon les méthodes classiques connues.

5 La fraction de la graine de caroube utilisée peut être de préférence sous forme d'une farine. La farine est obtenue par des moyens classiques de broyage tels que broyage dans des moulins du type :

- moulins à cylindre pour les farines de granulométrie moyenne type mesh 100, c'est-à-dire une farine présentant au plus 1 % en masse de particules supérieures à 80 mesh  
10 et au plus 10 % en masse de particules inférieures à 200 mesh ;

- moulins à broches (pin mills) pour les farines de granulométrie plus fine :

▫ type mesh 200, c'est-à-dire une farine ne présentant pas de particules supérieures à 80 mesh et présentant au plus 60 % en masse de particules inférieures à 200 mesh, et

15 ▫ type mesh 175, c'est-à-dire une farine présentant au plus 1 % en masse de particules supérieures à 80 mesh et au plus 75 % en masse de particules inférieures à 200 mesh.

La farine peut être utilisée telle quelle ou après traitement par des enzymes adaptées comme par exemple des protéases alcalines, acides et/ou neutres ; des  
20 lipases ; des phytases ; des phosphatases alcalines, acides et/ou neutres ; des amylases. Le traitement par les enzymes se fait par des méthodes classiques et connues.

La granulométrie de ladite farine peut fluctuer entre 10 et 150 microns. Dans le cas des farines traitées, cette granulométrie est plus particulièrement de 20 à 60  
25 microns, de préférence de 30 à 50 microns.

Les mesures de granulométrie peuvent être réalisées par la technique de granulométrie laser, à l'aide d'un granulomètre MALVERN, commercialisé par la société Malvern Instruments S.A.

On peut également envisager d'utiliser la fraction de la graine de caroube telle  
30 quelle, c'est-à-dire après séparation de l'endosperme sous forme de plaquettes, ou encore sous forme d'une pré-dispersion ou pré-suspension aqueuse.

Bien que l'invention soit décrite pour la graine de caroube, elle peut également s'appliquer à d'autres légumineuses comme par exemple le guar, le cassia, le tara. Ces légumineuses sont citées à titre indicatif et non limitatif.

35 Dans un autre mode de réalisation particulier de l'invention, la fermentation a lieu avec un mélange de sources d'azote organiques et minérales.

Dans ce cas, la source d'azote minérale peut être choisie parmi les nitrates d'ammonium ou de sodium, les phosphates ou les sulfates d'ammonium, sulfate de magnésium, sulfate de potassium ou de sodium, seuls ou en mélange.

La concentration en source organiques et éventuellement minérales d'azote dans le milieu de fermentation est comprise entre 1 et 80 g/l, de préférence entre 3 et 50 g/l, et plus préférentiellement entre 5 et 30 g/l.

Le milieu de fermentation renferme également une source de carbone assimilable par les microorganismes.

A titre de source de carbone constitutive du milieu de fermentation, on peut citer le glucose, le saccharose, le fructose, le galactose, le tréhalose, le mannose, le mélubiase, le raffinose, le maltotriose, le maltose, le lactose, le lactulose, le méthyl- $\beta$ -galactopyranoside, le méthyl- $\alpha$ -galactopyranoside, le cellobiose, le gentobiose, le méthyl- $\beta$ -D-glucopyranoside, le méthyl- $\alpha$ -D-glucopyranoside, l'esculine, le ribose, l'arabinose, le xylose, le palatinose, le rhamnose, le fucose, le mélézitose, le D(+) arabitol, le L(-) arabitol, le xylitol, le dulcitol, le tagatose, le glycérol, le myo-inositol, le mannitol, le maltitol, le turanose, le sorbitol, l'adonitol, le lyxose, l'érythritol, l'amidon avantageusement hydrolysé, les hydrolysats d'amidon, les mélanges de ces sucres, et les mélanges comprenant au moins un de ces sucres. Le glucose et le saccharose sont les sucres encore plus préférés.

La concentration en source de carbone assimilable est comprise entre 1 et 100 g/l, et de préférence entre 15 et 80 g/l.

Le milieu de fermentation peut, en outre, renfermer des oligo-éléments tels que des traces de sels minéraux tels que sulfates, chlorures de fer, de calcium, de manganèse, de magnésium, de sodium, de potassium, de nickel, de cobalt, de cuivre, de zinc ou leur mélange, ainsi que des vitamines, des nucléotides et/ou d'autres additifs conventionnels tels que des agents de contrôle de pH et des agents anti-moussants.

Le procédé de production d'exopolysaccharides selon l'invention par fermentation de microorganismes peut éventuellement se faire en présence d'enzyme(s) tels que des protéases alcalines, acides et/ou neutres ; des polysaccharases ; des amidases ; des peptidases, amyloglucosidases, phosphatases ; phytases.

Cependant, un des avantages importants du procédé selon l'invention réside dans le fait que l'on peut conduire la fermentation des microorganismes en l'absence d'enzyme. Il a été constaté de manière tout à fait surprenant qu'en l'absence d'enzyme ni la durée ni la productivité du procédé de fermentation n'étaient affectés. De plus, la suppression d'enzyme n'a pas entraîné une accumulation des produits résiduels insolubles et non dissouts en fin de fermentation qui peuvent rendre le milieu propice

au développement de souches contaminantes pouvant dégrader le moût avant séparation de l'exopolysaccharide.

La culture pure des microorganismes peut être effectuée de manière classique. L'homme du métier, en fonction du microorganisme sera en mesure de choisir les conditions notamment les températures et temps d'incubation, et la nature du milieu d'entretien dudit microorganisme.

Pour la conservation du microorganisme, il est préférable de prévoir au moins une étape de préculture. Par préculture, on entend une étape qui consiste à développer et à multiplier la souche bactérienne, sans production d'exopolysaccharide.

Le microorganisme est introduit dans le milieu de fermentation de manière connue en soi à l'aide d'inoculum ou de cultures intermédiaires.

La fermentation peut être réalisée à des pressions comprises entre 0 et 4 bar.

On peut conduire la fermentation à une température comprise entre 15 et 100°C, de préférence entre 25 et 80°C, et plus particulièrement entre 25 et 35°C.

Le pH du milieu de fermentation peut varier entre 5 et 9, et de préférence entre 6 et 8. Le pH peut être ajusté, selon le cas, avec une base telle que la soude, la potasse, ou l'ammoniaque, ou avec un acide tel que l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide chlorhydrique ou l'acide nitrique.

Le milieu de fermentation, placé dans une cuve ou un récipient de fermentation, peut être avantageusement soumis à une agitation et à une aération. Cette agitation peut être exercée par exemple au moyen d'un secoueur réciproque, d'un secoueur giratoire, d'un ou plusieurs mobile(s) d'agitation ou d'une colonne à bulles. Le temps de fermentation est habituellement supérieur à 30 heures, mais généralement compris entre 40 et 100 heures.

La productivité est mesurée en fonction de la quantité d'exopolysaccharide produit, exprimée en grammes, par rapport au kg de moût, par heure de fermentation. Avec le procédé de l'invention, une amélioration en productivité de 3 à 15 %, et de préférence de 5 à 10 % a été observée.

Après achèvement de la fermentation, l'exopolysaccharide peut être récupéré du moût et purifié selon les méthodes connues telles que filtration, concentration, cristallisation ou extraction par solvants.

L'invention couvre également les exopolysaccharides obtenus ou susceptibles d'être obtenus par le procédé. Elle couvre plus particulièrement la gomme xanthane produite par le procédé de l'invention.

La gomme xanthane obtenue selon le procédé de l'invention, en solution aqueuse à 1% dans l'eau distillée, présente une transparence élevée, c'est-à-dire de

l'ordre de 70 à 95 % ou encore de l'ordre de 80 à 95%. La transmittance de la solution aqueuse est mesurée par spectrophotométrie à 600 nm.

Les exemples suivants illustrent la présente invention sans toutefois en limiter la portée .

## EXEMPLES

### 10 Exemple 1

Cet exemple décrit les phases de préculture 1 et 2 pour le *Xanthomonas campestris*.

#### Préculture 1 :

Composition du milieu PYS10 :

15

- |                     |        |           |
|---------------------|--------|-----------|
| - Extrait de levure | 3 g/l  | Oxoïd     |
| - Extrait de malt   | 3 g/l  | Oxoïd     |
| - peptone de soja   | 5 g/l  | Oxoïd     |
| - Saccharose        | 10 g/l | Eurosucre |

20

- pH ajusté à 7 par  $H_2SO_4$
- qsp 1 litre avec de l'eau potable

Tous les constituants sont mis en solutions dans 1 litre d'eau potable, homogénéisés par agitation magnétique et répartis dans les erlenmeyers de 500 ml par fraction de 112 ml.

25 La préparation est autoclavée 30 minutes à 120°C.

La souche est initialement conservée sous la forme de tubes congelés à -196°C par le procédé de congélation azote liquide (CAL).

Pour une congélation azote liquide (CAL) on réalise une préculture sur milieu PYG10 ayant la composition suivante :

30

- |                     |      |                             |
|---------------------|------|-----------------------------|
| ▫ extrait de malt   | 3 g  | (procuré auprès de Oxoïd)   |
| ▫ extrait de levure | 3 g  | (Oxoïd)                     |
| ▫ peptone de soja   | 5 g  | (Oxoïd)                     |
| ▫ glucose           | 10 g | (procuré auprès de Prolabo) |

35

- eau de source qsp 1 l.

Pour la préparation du milieu, tous les ingrédients sont dispersés dans l'eau de source. Le pH est ajusté à 6,5 avec  $\text{H}_2\text{SO}_4$  10 %. Le milieu est stérilisé 20 minutes à 120°C, à l'autoclave.

Après 24 heures d'incubation à 28°C sur secoueur giratoire à 220 tr/min et amplitude = 50 mm, 10 % en volume de glycérol pur stérile sont ajoutés à la culture. La culture est ensuite répartie dans des cryotubes de contenances variant de 1 ml à 10 ml, de préférence de 2 ml à 4 ml.

Ces tubes sont conservés dans l'azote liquide.

La préculture 1 estensemencée à l'aide d'un cryotube préalablement décongelé à l'air ambiant. La totalité ou 50 % du cryotube sont introduits de façon stérile dans les erlenmeyers de 500 ml, dont le milieu a été autoclavé et donc stérilisé de la façon décrite ci-dessus.

Le milieu ainsiensemencé est incubé 24 heures à 28°C sur un secoueur giratoire à 220 tr/mn et une amplitude de 50 mm.

Après 24 heures d'incubation nous obtenons une préculture dont le pH varie de 7 à 7,5, dont la viscosité est comprise entre 50 et 500 mPa.s et dont la population bactérienne en *Xanthomonas campestris* est supérieure à  $10^{10}$ /ml.

#### Préculture 2 :

La préculture 1 sert pourensemencer la préculture 2.

#### Composition du milieu de préculture 2 :

25	- Saccharose	10 g/l	Eurosucre
	- Farine de germe de caroube	4 g/l	Meyhall AG
	- $\text{Na}_2\text{HPO}_4$	3 g/l	Europhos
	- Eau potable ou eau adoucie	qsp 1 litre	
	- pH ajusté à l'acide sulfurique 10% pour avoir 6,5 avant stérilisation.		

30

Tous les constituants sont mis en suspension dans 1 litre d'eau potable et le pH est ajusté à 6,5. Le milieu complet est autoclavé pendant 30 mn à 120°C après avoir réparti ce dit milieu dans des erlenmeyers de 500 ml par fraction de 112 ml.

35

Ces erlenmeyers sont ensuiteensemencés avec 0 ;1 à 0 ;2ml de la préculture 1. Ces erlenmeyers sont mis à incuber 24 à 30 heures heures à 28°C sur un secoueur giratoire à 220 tr/mn et une amplitude de 50 mm.

Après 24 à 30 heures d'incubation nous obtenons une préculture dont le pH varie de 5,8 à 7,1, dont la viscosité est comprise entre 100 et 1000 mPa.s et dont la population bactérienne en *Xantomonas campestris* est supérieure à  $10^9$  /ml

### 5 Exemple 3

Cet exemple décrit la préparation et l'obtention de l'exopolysaccharide selon deux procédés de fermentation, l'un avec une source d'azote organique et l'autre avec une source mixte d'azote organique et d'azote minérale.

10 Dans cet exemple deux étapes de "préculture" interviennent. Ces étapes ont lieu en erlenmeyers de 500 ml, ce qui correspond à 100 ml de milieu (voir les exemples 1 et 2).

L'étape de production qui correspond à l'étape au cours de laquelle la souche bactérienne produit le polysaccharide, a lieu en fermenteur de 20 litres, dont 15 litres utiles.

### 15 Etape préculture 1 et 2:

Les étapes de préculture 1 et 2 sont effectuées de la même manière que dans les exemples 1 et 2.

### Etape de production :

### 20 Milieu1 :

La dernière étape est l'étape de production de l'exopolysaccharide.

Le milieu du fermenteur 1 a la composition suivante (ramenée à 1 litre de milieu):

25	▫ saccharose	42 g	Eurosucre
	▫ Farine de germe de caroube	6 g	Meyhall AG
	▫ $MgSO_4, 7H_2O$	0,25 g	Bittersalz
	▫ $Na_2HPO_4$	2 g	Prolabo
	▫ antimousse organique	0,5 ml	
	▫ eau potable ou adoucie	qsp 1 l	

La préparation des sources azotées et carbohydrate est réalisée séparément.

30 **Saccharose** ⇒ Qsp grammes de glucose sont dissous dans qsp 3 l d'eau adoucie ou potable dans un flacon de Mariotte. Le pH est abaissé à 5,2 par  $H_2SO_4$  10 %. La solution est stérilisée en flacon de Mariotte 45 minutes à 120°C à l'autoclave.

35 **Farine de germe de caroube + sels** ⇒ Qsp grammes de farine de germe de caroube, 30 g de  $Na_2HPO_4$ , 3,75 g de  $MgSO_4, 7H_2O$ , et 7,5 ml d'antimousse sont dissous dans qsp 7 l d'eau adoucie. Le pH est ajusté à 6 avec  $H_2SO_4$  10 %. Ce mélange est stérilisé *in situ* 45 minutes à 120°C.



Soude 1N  $\Rightarrow$  40 g de pastilles de NaOH sont dissous dans qsp 1l d'eau distillée. La solution est stérilisée en flacon de Mariotte 30 minutes à 120°C à l'autoclave.

Quand tous les ingrédients sont à 28°C, ils sont mélangés dans le fermenteur. Le fermenteur est ensuite inoculé avec qsp de préculture 2.

5 Les conditions de fermentation dans le fermenteur sont les suivantes :

Agitation  $\Rightarrow$  200 tr/min de 0 à 20 heures d'âge, puis 400 tr/min. jusqu'à la fin de la fermentation

Aération  $\Rightarrow$  400 l/h de 0 à 18 heures puis 825 l/h de 24 heures jusqu'à la fin de la fermentation

10 La température est régulée à 28°C.

Le pH est régulé à 6,8 par NaOH 1N.

La pression est la pression atmosphérique .

#### Milieu 2 :

15 Le milieu 2, qui peut être une alternative au milieu 1, a la composition suivante :

▫ Saccharose	42 g/l	(Eurosucré)
▫ $\text{NH}_4\text{NO}_3$	1,15 g/l	(Atochem)
▫ $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	0,25 g/l	(Bitter salz)
▫ $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$	0,217 g/l	(Europhos)
20 ▫ Soluble de farine de germe de caroube	36 g/l	(Meyhall AG)
▫ antimousse organique	0,2 ml	
▫ eau adoucie qsp 1 l		

Saccharose  $\Rightarrow$  Qsp grammes de glucose sont dissous dans qsp 3 l d'eau adoucie. Le pH est ajusté à 5 par  $\text{H}_2\text{SO}_4$  10 %. La solution est stérilisée en flacon de Mariotte 30 minutes à 120°C à l'autoclave.

25 Azote + sels  $\Rightarrow$  17.25 g de  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ , 3.75 g de  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ , 3.22 gr de  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ , 525 gr de soluble de farine de germe de caroube et 3 ml d'antimousse sont dissous dans qsp 7l d'eau adoucie. Le pH de cette solution est ajusté à 6 avec  $\text{H}_2\text{SO}_4$  10 %. Ce mélange est stérilisé *in situ* 45 minutes à 120°C.

30 Soude 1N  $\Rightarrow$  40 g de pastilles de NaOH sont dissous dans qsp 1l d'eau distillée. La solution est stérilisée en flacon de Mariotte 30 minutes à 120°C à l'autoclave.

Le soluble de farine de germe de caroube est préparé par dilution de farine à 6 à 15% dans de l'eau adoucie. Cette solution peut ou non être traitée par des enzymes type protéases alcalines, acides et/ou neutres ; des lipases ; des phytases ; des phosphatases alcalines, acides et/ou neutres ; des amylases, avant d'être décantée ou non sur un décanteur rotatif horizontal afin d'éliminer les impuretés pouvant nuire à la qualité du produit final.

Quand tous les ingrédients sont à 28°C, ils sont mélangés dans le fermenteur (milieu 1 ou 2). Le fermenteur est ensuite inoculé avec qsp de préculture 2.

Les conditions de fermentation dans le fermenteur 2 sont les suivantes :

- 5 Agitation  $\Rightarrow$  200 tr/min de 0 à 20 heures d'âge, puis 400 tr/min jusqu'à la fin de la fermentation
- Aération  $\Rightarrow$  400 l/h de 0 à 24 heures puis 825 l/h de 24 heures jusqu'à la fin de la fermentation
- La température est régulée à 28°C.
- Le pH est régulé à 6,8 par NaOH 1N.
- 10 La pression est la pression atmosphérique ou sous une pression pouvant aller de 0,5 à 4 bars.

#### Résultats de fermentation :

- 15 Selon le milieu de culture étudié, les durées de fermentations varient de 45 à 65 heures, les matières sèches précipitables à l'isopropanol varient de 20 à 30 g/kg, et le rendement pondéral par rapport à la source de carbone mise en oeuvre varie de 50 à 70 %. Le moût de fermentation obtenu présente une luminosité et une brillance jamais observé avec n'importe quelle autre source d'azote.

## REVENDICATIONS

Feuille 22048 Revendication

1. Procédé de production d'exopolysaccharides par fermentation de microorganismes caractérisé en ce que l'on conduit la fermentation dans un milieu nutritif comportant au moins une source de carbone assimilable par les microorganismes et au moins une source organique d'azote, ladite source dérivant d'une fraction de la graine de caroube.  
5
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la fraction de la graine de caroube possède une teneur en protéines d'au moins 45 %, de préférence d'au moins 50 %, et plus préférentiellement d'au moins 60 %, en poids par rapport au poids sec de la matière sèche.  
10
3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que les protéines ont avantageusement un taux élevé en arginine, en glutamine et/ou acide glutamique, et en lysine.  
15
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la fraction de la graine de caroube contient une teneur en lipides d'au moins 4 %, avantageusement d'au moins 5 %, et encore plus avantageusement varie entre 7 et 15% en poids en poids par rapport à la matière sèche.  
20
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la fraction est le germe de graine de caroube.  
25
6. Procédé l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la fraction de la graine de caroube est sous forme d'une farine.
7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la granulométrie de la farine fluctue entre 10 et 150 microns.  
30
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'on conduit la fermentation dans un milieu nutritif comportant au moins une source minérale d'azote.  
35
9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la source d'azote minérale est choisie parmi les nitrates d'ammonium ou de sodium, les

phosphates ou les sulfates d'ammonium, sulfate de magnésium, sulfate de potassium ou de sodium, seuls ou en mélange.

5 10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la concentration en source organiques et éventuellement minérales d'azote dans le milieu de fermentation est comprise entre 1 et 80 g/l, de préférence entre 3 et 50 g/l, et plus préférentiellement entre 5 et 30 g/l.

10 11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que la source de carbone assimilable est choisie parmi le glucose ou le saccharose.

12. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que la concentration en source de carbone assimilable est comprise entre 1 et 100 g/l, et de préférence entre 15 et 80 g/l.

15 13. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en l'on conduit la fermentation des microorganismes en l'absence d'enzyme.

20 14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que l'on conduit la fermentation à une température comprise entre 15 et 100°C, de préférence entre 25 et 80°C, et plus particulièrement entre 25 et 35°C.

25 15. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que le microorganisme est choisi dans le groupe des bactéries du genre *Xanthomonas*, du genre *Alcaligenes*, du genre *Agrobacterium*, du genre *Arthrobacter*, du genre *Azotobacter*, du genre *Pseudomonas*, du genre *Corynebacterium*, des champignons du genre *Sclerotium*, du genre *Aspergillus*, et des levures du genre *Hansenula*.

16. Exopolysaccharide obtenu par un procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 15.

## REVENDICATIONS

1. Procédé de production d'exopolysaccharides par fermentation de microorganismes caractérisé en ce que l'on conduit la fermentation dans un milieu nutritif comportant au moins une source de carbone assimilable par les microorganismes et au moins une source organique d'azote, ladite source dérivant d'une fraction de la graine de caroube.  
5
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la fraction de la graine de caroube possède une teneur en protéines d'au moins 45 %, de préférence d'au moins 50 %, et plus préférentiellement d'au moins 60 %, en poids par rapport au poids sec de la matière sèche.  
10
3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que les protéines ont avantageusement un taux élevé en arginine, en glutamine et/ou acide glutamique, et en lysine.  
15
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la fraction de la graine de caroube contient une teneur en lipides d'au moins 4 %, avantageusement d'au moins 5 %, et encore plus avantageusement varie entre 7 et 15% en poids en poids par rapport à la matière sèche.  
20
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la fraction est le germe de graine de caroube.  
25
6. Procédé l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la fraction de la graine de caroube est sous forme d'une farine.
7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la granulométrie de la farine fluctue entre 10 et 150 microns.  
30
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'on conduit la fermentation dans un milieu nutritif comportant au moins une source minérale d'azote.  
35
9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que la source d'azote minérale est choisie parmi les nitrates d'ammonium ou de sodium, les phosphates ou les

sulfates d'ammonium, sulfate de magnésium, sulfate de potassium ou de sodium, seuls ou en mélange.

5 10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la concentration en source organiques et éventuellement minérales d'azote dans le milieu de fermentation est comprise entre 1 et 80 g/l, de préférence entre 3 et 50 g/l, et plus préférentiellement entre 5 et 30 g/l.

10 11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que la source de carbone assimilable est choisie parmi le glucose ou le saccharose.

12. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que la concentration en source de carbone assimilable est comprise entre 1 et 100 g/l, et de préférence entre 15 et 80 g/l.

15 13. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en l'on conduit la fermentation des microorganismes en l'absence d'enzyme.

20 14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que l'on conduit la fermentation à une température comprise entre 15 et 100°C, de préférence entre 25 et 80°C, et plus particulièrement entre 25 et 35°C.

25 15. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que le microorganisme est choisi dans le groupe des bactéries du genre *Xanthomonas*, du genre *Alcaligenes*, du genre *Agrobacterium*, du genre *Arthrobacter*, du genre *Azotobacter*, du genre *Pseudomonas*, du genre *Corynebacterium*, des champignons du genre *Sclerotium*, du genre *Aspergillus*, et des levures du genre *Hansenula*.

16. Exopolysaccharide obtenu par un procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 15.

## REVENDEICATIONS

1. Procédé de production d'exopolysaccharides par fermentation de microorganismes caractérisé en ce que l'on conduit la fermentation dans un milieu nutritif comportant au moins une source de carbone assimilable par les microorganismes et au moins une source organique d'azote, ladite source dérivant d'une fraction de la graine de caroube possédant une teneur en protéines d'au moins 45 % en poids par rapport au poids sec de la matière sèche.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la fraction de la graine de caroube possède une teneur en protéines d'au moins 50 %, et de préférence d'au moins 60 %, en poids par rapport au poids sec de la matière sèche.
3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que les protéines ont avantageusement un taux élevé en arginine, en glutamine et/ou acide glutamique, et en lysine.
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la fraction de la graine de caroube contient une teneur en lipides d'au moins 4 %, avantageusement d'au moins 5 %, et encore plus avantageusement varie entre 7 et 15% en poids en poids par rapport à la matière sèche.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la fraction est le germe de graine de caroube.
6. Procédé l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la fraction de la graine de caroube est sous forme d'une farine.
7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la granulométrie de la farine fluctue entre 10 et 150 microns.
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'on conduit la fermentation dans un milieu nutritif comportant au moins une source minérale d'azote.
9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que la source d'azote minérale est choisie parmi les nitrates d'ammonium ou de sodium, les phosphates ou les

sulfates d'ammonium, sulfate de magnésium, sulfate de potassium ou de sodium, seuls ou en mélange.

- 5 10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la concentration en source organiques et éventuellement minérales d'azote dans le milieu de fermentation est comprise entre 1 et 80 g/l, de préférence entre 3 et 50 g/l, et plus préférentiellement entre 5 et 30 g/l.
- 10 11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que la source de carbone assimilable est choisie parmi le glucose ou le saccharose.
- 15 12. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que la concentration en source de carbone assimilable est comprise entre 1 et 100 g/l, et de préférence entre 15 et 80 g/l.
13. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en l'on conduit la fermentation des microorganismes en l'absence d'enzyme.
- 20 14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que l'on conduit la fermentation à une température comprise entre 15 et 100°C, de préférence entre 25 et 80°C, et plus particulièrement entre 25 et 35°C.
- 25 15. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que le microorganisme est choisi dans le groupe des bactéries du genre *Xanthomonas*, du genre *Alcaligenes*, du genre *Agrobacterium*, du genre *Arthrobacter*, du genre *Azotobacter*, du genre *Pseudomonas*, du genre *Corynebacterium*, des champignons du genre *Sclerotium*, du genre *Aspergillus*, et des levures du genre *Hansenula*.
- 30 16. Exopolysaccharide obtenu par un procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 15.